

Исправление в статье «Клиническое течение младенческих колик на фоне лечения моно- и мультипробиотиками»

В.П. Новикова , <https://orcid.org/0000-0002-0992-1709>, novikova-vp@mail.ru

Д.М. Магамедова, <https://orcid.org/0009-0001-6280-8617>, dinaramagamedova09@gmail.com

А.Е. Блинов, <https://orcid.org/0000-0002-2895-7379>

О.Н. Варламова, <https://orcid.org/0000-0002-2195-0756>

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 194100, Россия, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2

Опубликована в: Медицинский совет. 2024;18(1):190–196. <https://doi.org/10.21518/ms2024-038>.

In the article “Clinical course of infant colic during treatment with mono- and multiprobiotics”

Valeriya P. Novikova , <https://orcid.org/0000-0002-0992-1709>, novikova-vp@mail.ru

Dinara M. Magamedova, <https://orcid.org/0009-0001-6280-8617>, dinaramagamedova09@gmail.com

Alexander E. Blinov, <https://orcid.org/0000-0002-2895-7379>

Olga N. Varlamova, <https://orcid.org/0000-0002-2195-0756>

St Petersburg State Pediatric Medical University; 2, Litovskaya St., St Petersburg, 194100, Russia

Published in: Meditsinskiy Sovet. 2024;18(1):190–196. <https://doi.org/10.21518/ms2024-038>.

Страница – 193. Колонка – левая

Текст

Как следует из *рис. 1*, начиная с 5-го дня лечения и до конца курса дети, получавшие Бак-Сет Беби, имели значимо более короткую длительность плача, чем дети первой и третьей групп (1-я группа – $3,08 \pm 0,6$ ч; 2-я группа – $1,91 \pm 0,7$ ч; 3-я группа – $3,08 \pm 0,6$ ч; $p < 0,001$), а дети первой группы имели меньшую продолжительность плача в сравнении с группой 3; $p < 0,05$.

Текст

Колики полностью купированы у 53,3% детей, получавших BioGaia Probiotic drops for baby, у 87,5% детей, получавших мультипробиотик Бак-Сет Беби, и только у 10% детей, получавших симптоматическое лечение ($p < 0,001$).

Следует читать

Как следует из *рис. 1*, начиная с 5-го дня лечения и до конца курса дети, получавшие Бак-Сет Беби, имели значимо более короткую длительность плача, чем дети первой и третьей групп (1-я группа – $3,08 \pm 0,6$ ч; 2-я группа – $1,91 \pm 0,7$ ч; 3-я группа – $3,4 \pm 0,6$ ч; $p < 0,001$), а дети первой группы имели меньшую продолжительность плача в сравнении с группой 3; $p < 0,05$.

Следует читать

Колики полностью купированы у 87,5% детей, получавших мультипробиотик Бак-Сет Беби, у 53,3% детей, получавших BioGaia Probiotic drops for baby, и только у 10% детей, получавших симптоматическое лечение ($p < 0,001$).

Страница – 195. Колонка – левая

Текст

Метеоризм обычно купировался на 10–12-й день лечения, но при использовании Бак-Сет Беби он исчезал значимо раньше (1-я группа – 11 дней, 2-я группа – 0 дней и 3-я группа – 12 дней, $p < 0,001$).

Следует читать

Метеоризм обычно купировался на 10–12-й день лечения, но при использовании Бак-Сет Беби он исчезал значимо раньше (1-я группа – 11 дней, 2-я группа – 10 дней и 3-я группа – 12 дней, $p < 0,001$).

Оригинальную статью можно найти по <https://doi.org/10.21518/ms2024-038>.

Внесение исправлений не повлияло на сделанные авторами выводы. Исправление было внесено в онлайн-версию журнала.

These errors do not affect the conclusions of the article. The article has been corrected online.