ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ АДРЕНАРХЕ

У МАЛЬЧИКОВ ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С целью оценки роста и развития школьников, проживающих в условиях мегаполиса, обследовано в Санкт-Петербурге 809 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Характеристика показателей физического развития дана по нормативам «WHO Growth Reference 2007»; уровня полового созревания – с помощью фенотипической оценки по методике М.В. Максимовой. Выявлена высокая распространенность у школьников избыточной массы тела (13,3%) и ожирения (12,5%). Отмечено, что инициация полового созревания у мальчиков происходит в более ранние сроки по сравнению с приведенными в литературе данными.

Ключевые слова: физическое и половое развитие, мальчики, школьники.

V.L. GRITSINSKAYA, S.M. MAMEDOVA, I.L. NIKITINA

«Almazov National Medical Research Centre» of the Ministry of Health of Russia, Saint-Petersburg, Russia

EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND ADRENARCHE LEVEL OF PUBERTY AGE BOYS IN ST. PETERSBURG

In order to assess the growth and development of schoolchildren living in a metropolis, 809 boys aged 12 to 15 years were examined in St. Petersburg. Characteristics of indicators of physical development are given according to the norms of «WHO Growth Reference 2007»; the level of puberty - with the help of a phenotypic evaluation according to the method of M.V. Maksimova. The high prevalence of overweight (13.3%) and obesity (12.5%) among schoolchildren was revealed. It is noted that the initiation of the boys' puberty occurs at the earlier time compared with the data given in the literature.

Keywords: physical and sexual development, boys, schoolchildren.

ВВЕДЕНИЕ

Общепризнанно, что гармоничность роста, развития и репродуктивный потенциал подрастающего поколения – ведущие показатели здоровья и социального благополучия общества [1]. Традиционно вопросам репродуктивного здоровья женской части населения уделяется больше внимания. Изучение динамики полового развития у мальчиков не получило внимания, подобного данной проблеме у девочек. Проведенные исследования полового созревания мальчиков в большинстве случаев не носили популяционного характера, а результаты многих из них оказались противоречивы в связи с отсутствием стандартизированных подходов [2–6]. На сегодняшний день в рамках общего здоровья подростков актуально обсуждение вопросов андрологического здоровья мальчиков и юношей, поскольку правильно и вовремя завершившийся у них пубертат определяет окончательное становление репродуктивной функции у взрослого поколения [7, 8]. Учитывая вышесказанное, мы поставили целью нашего исследования провести оценку физического и полового развития мальчиков-подростков, проживающих в условиях мегаполиса.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методом случайной выборки в различных районах Санкт-Петербурга проведено обследование 809 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. В начале 2016–2017 учеб-

ного года в рамках медицинских профилактических осмотров проведено обследование, которое включало соматометрию (длина и масса тела) и визуальную оценку уровня развития вторичных половых признаков. Обследование школьников проводилось с соблюдением этических норм на основе принципа добровольности, оформленного в виде письменного информированного согласия законных представителей подростков.

Обследование школьников проводилось с соблюдением этических норм на основе принципа добровольности, оформленного в виде письменного информированного согласия законных представителей подростков

Оценка физического развития (ФР) дана в соответствии с нормативами ВОЗ – «WHO Growth Reference 2007» [9]. Оценка уровня ФР школьников проведена путем сравнительного анализа показателей длины тела детей (ДТ) с возрастными нормативами. В зависимости от числа стандартных отклонений (SD), отличающих значение ДТ мальчиков от медианы возрастного-половой шкалы, выделены следующие варианты ФР: «среднее» (СФР; $\pm 1SD$); «выше среднего» (ВСФР; от $+1SD$ до $+2SD$); «высокое» (ВФР; более $+2SD$); «ниже среднего» (НСФР; от $-1SD$ до $-2SD$); «низкое» (НФР; менее $-2SD$). Гармоничность соотношения длины и массы тела оценивалась с помощью массо-ростового индекса Кетле₂ (body mass index – BMI), значение которого

определялось путем деления массы тела (кг) на квадрат длины тела (m^2). В зависимости от соответствия значения BMI нормативам центильной шкалы выделены следующие варианты ФР: гармоничное (ГФР; 15–85 центили), дисгармоничное за счет дефицита массы тела (ДМТ; 15–5 центили), недостаточность питания (НП; ниже 5 центиля), дисгармоничное за счет избыточной массы тела (ИЗМТ; 85–95 центили); ожирение (Ож) регистрировалось при превышении значения BMI показателей 95 центиля.

При проведении оценки уровня полового развития в отечественной педиатрической практике часто используется комплексная фенотипическая оценка по М.В. Максимовой [10]. Мы также дали характеристику уровня адrenaрхе (степени оволосения лица, лобка и аксиллярной области) у мальчиков по этой балльной оценочной шкале.

Статистическая обработка материала исследования выполнена методами вариационной статистики с помощью прикладных программ «STATISTICA v.10.0 © STATSOFT, USA». Базы данных проверены на нормальность распределения выборки с помощью критерия Колмогорова. Для количественных показателей были рассчитаны средние арифметические величины (M) и ошибки средних (m). Качественные показатели в виде P[ДИ]%, где P – процентная доля, ДИ – 95% доверительный интервал для доли. Анализ статистической значимости различий показателей проведен с помощью критерия χ^2 Пирсона (с поправкой Йейтса). Различия результатов считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Особенностью пубертатного периода является неразрывная связь физического и полового развития. В этот период у мальчиков происходит ускорение линейного роста, нарастание мышечной массы, созревание костной ткани и формирование пропорций тела, характерных для мужского пола. Факторы, определяющие сроки полового созревания, подразделяются на немодифицированные (преимущественно генетические) и модифицированные (наличие избыточной массы тела, уровень физической и эмоциональной нагрузок, соци-

альные условия, экологические факторы), которые принципиально поддаются коррекции [1]. В настоящее время возрастает интерес к оценке полового созревания мальчиков с избыточной массой тела. Ряд авторов отмечает, что признаки начала пубертата появлялись раньше у более высокорослых мальчиков и мальчиков с более высокими показателями BMI [5]. Однако большинство исследователей отмечают задержку и различные формы нарушения полового созревания у мальчиков с избыточной массой тела, и особенно с ожирением [11–14].

Ряд авторов отмечает, что признаки начала пубертата появлялись раньше у более высокорослых мальчиков и мальчиков с более высокими показателями BMI

Учитывая вышесказанное, мы провели анализ соматометрических показателей обследованных подростков. Выявлено, что у обследованных школьников в соответствии с общебиологическими закономерностями отмечалось увеличение длины тела с возрастом. Средние значения ДТ в группе 12-летних мальчиков составили $153,0 \pm 0,4$ см; в возрасте 15 лет – $171,6 \pm 0,6$ см. Максимальная прибавка ДТ отмечена за 14-й год жизни – 7,1 см; ниже за 13-й год – 6,6 см; еще меньше ежегодная прибавка в росте за 15-й год жизни – 4,9 см. Масса тела (МТ) также имеет тенденцию к увеличению с возрастом: от $45,58 \pm 0,51$ кг в 12 лет до $61,73 \pm 0,87$ кг в 15 лет. Ежегодная прибавка МТ выше за 14-й год – 5,82 кг; меньше за 13-й год – 5,6 кг и еще ниже за 15-й год – 4,73 кг. Таким образом, прибавки ДТ и МТ происходят синхронно, с максимальным уровнем прироста показателей в возрасте от 13 до 14 лет.

Важное значение в индивидуальной оценке уровня ФР имеет сравнение соматометрических показателей ребенка с нормативными показателями. Распределение школьников по вариантам уровня ФР представлена в таблице 1. Во всех группах у большинства учащихся (57,0–63,9%) ДТ была в пределах средних значений. Среди 13-летних школьников мальчиков со СФР было меньше, чем в других возрастных группах; причем раз-

Таблица 1. Характеристика уровня физического развития мальчиков P[ДИ]%

Возраст (лет)	Физическое развитие				
	НФР	НСФР	СФР	ВСФР	ВФР
12 (n = 124)	1,0 [0,5–1,5]	6,2 [5,0–7,4]	63,9 [61,5–66,3]	19,2 [17,2–21,2]	9,7 [8,2–11,2]
13 (n = 252)	1,9 [1,3–2,5]	9,5 [8,2–10,8]	57,0 [54,7–59,3]	20,7 [18,9–22,5]	10,9 [9,5–12,3]
14 (n = 325)	1,4 [0,8–2,0]	8,9 [7,6–10,2]	60,9 [58,7–63,1]	21,2 [19,3–23,1]	7,6 [6,4–8,8]
15 (n = 108)	1,4 [0,6–2,2]	11,3 [9,2–13,4]	62,0 [58,7–65,3]	22,1 [19,3–24,9]	3,2 [2,0–4,4]
P		$P_{12-15} = 0,006$; $P_{12-14} = 0,01$; $P_{12-13} = 0,02$	$P_{12-13} = 0,02$		$P_{12-15} = 0,004$; $P_{13-15} = 0,01$

Таблица 2. Характеристика гармоничности физического развития мальчиков Р[ДИ]%

Возраст (лет)	Физическое развитие				
	НП	ДМТ	ГФР	ИзМТ	Ож
12 (n = 124)	4,9 [2,9–4,9]	8,2 [6,8–9,6]	60,9 [58,4–63,4]	16,3 [17,3–21,1]	9,7 [8,2–11,2]
13 (n = 252)	4,4 [3,5–5,3]	7,6 [6,4–8,8]	57,2 [54,9–59,5]	15,2 [13,6–16,8]	15,6 [14,0–17,2]
14 (n = 325)	8,1 [6,8–9,4]	7,9 [6,6–9,2]	56,4 [54,1–58,7]	12,7 [11,2–14,2]	14,9 [13,3–16,5]
15 (n = 108)	6,1 [4,5–7,7]	7,0 [5,3–8,7]	68,1 [64,9–71,3]	8,9 [7,0–10,8]	9,9 [7,9–11,9]
р	$P_{12-14} = 0,01$ $P_{13-14} = 0,02$		$P_{14-15} = 0,004$; $P_{13-15} = 0,006$	$P_{13-15} = 0,02$	

Таблица 3. Распределение мальчиков по степени развития вторичных половых признаков Р[ДИ]%

Возраст	Признак полового развития				
	Степень оволосения лобка				
	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
12 лет (n = 124)	48,7 [44,2–53,2]	41,5 [37,1–45,9]	9,8 [7,1–12,5]	-	-
13 лет (n = 252)	3,2 [2,1–4,3]	22,9 [20,3–25,5]	59,9 [56,8–63,0]	14,0 [11,8–16,2]	-
14 лет (n = 325)	0,9 [0,4–1,4]	8,3 [6,9–9,9]	40,5 [37,8–43,2]	46,6 [43,8–49,4]	3,7 [2,6–4,8]
15 лет (n = 108)	-	3,2 [1,6–4,8]	38,0 [33,3–42,7]	52,4 [47,6–57,2]	6,4 [4,1–8,7]
	Степень оволосения подмышечных впадин				
	Ax_0	Ax_1	Ax_2		
12 лет (n = 124)	67,0 [62,8–71,2]	30,6 [26,4–34,6]	2,4 [1,3–3,7]		
13 лет (n = 252)	34,5 [31,5–37,5]	55,8 [52,7–58,9]	9,7 [7,8–11,6]		
14 лет (n = 325)	8,1 [6,6–9,6]	73,3 [70,8–75,8]	18,6 [16,4–20,8]		
15 лет (n = 108)	1,8 [0,5–3,1]	69,8 [65,4–74,2]	28,4 [24,1–32,7]		
	Степень оволосения лица				
	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4
12 лет (n = 124)	82,4 [79,0–85,8]	16,0 [12,7–19,3]	1,6 [0,4–2,8]	-	-
13 лет (n = 252)	55,8 [52,7–58,9]	39,4 [36,3–42,5]	4,0 [2,8–5,2]	0,8 [0,2–1,4]	-
14 лет (n = 325)	12,5 [10,7–14,3]	42,9 [40,2–45,6]	36,5 [33,8–39,2]	6,3 [5,0–7,6]	1,8 [1,0–2,6]
15 лет (n = 108)	3,7 [1,8–5,5]	41,3 [36,6–46,0]	38,1 [33,4–42,8]	7,9 [5,3–10,5]	9,0 [6,1–11,9]

ница показателей с 14-летними школьниками имеет статистически значимую разницу ($p = 0,02$). Во всех группах учащихся с ДТ, превышающей средние показатели, было больше (25,3–31,6%), чем сверстников с низкой ДТ (7,2–12,7%). В возрасте 12 лет мальчиков с показателями ДТ ниже среднего было меньше, чем в старших группах ($p = 0,006 \div p = 0,02$). Число школьников с ВСФР во всех группах существенно не различалось. Мальчиков с высокорослостью в возрасте 12–13 лет больше, чем в старших группах, причем в сравнении с 15-летними юношами показатели имеют статистически значимую разницу.

В соответствии с мировой практикой оценки нутритивного статуса детей мы использовали показатели массо-ростового индекса (BMI) для характеристики гармоничности ФР школьников. Данные, отражающие соотношение длины и массы тела обследованных мальчиков, представлены в *таблице 2*. У большинства учащихся во всех группах соотношение ДТ и МТ было гармоничным (56,4–68,1%). Среди 15-летних школьников мальчиков с ГФР было больше, чем в младших возрастных группах, причем в сравнении с 13 и 14-летними мальчиками разница показателей имеет статистически значимую разницу ($p = 0,006$ и $p = 0,004$). Среди дисгармоничных вариан-

тов ФР у учащихся преобладали варианты, обусловленные повышенной массой тела (18,8–30,8%); с недостаточной МТ мальчиков было меньше (12,0–16,0%). Число мальчиков с ИзМТ с возрастом снижается; причем разница показателей 15-летних и 13-летних школьников имеет статистически значимую разницу. Число школьников имеет статистически значимую разницу. Число школьников с ожирением больше в возрасте 13 и 14 лет, чем в возрасте 12 и 15 лет, но статистически значимой разницы показателей не выявлено. Мальчиков с ДМТ во всех группах было практически одинаково. Школьников с недостаточностью питания среди 14-летних мальчиков больше, чем в 15, 13 ($p = 0,02$) и 12 лет ($p = 0,01$).

Половое развитие представляет собой неотъемлемую часть пубертата, являясь результатом гармоничной работы нейроэндокринной системы. Известно, что ведущая роль в инициации пубертата принадлежит регулирующей функции гипоталамо-гипофизарно-гонадной и в меньшей степени – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Результатом активации первой из них является старт и прогрессирование гонадархе, результатом активации второй – старт и прогрессирование адренархе. На старте пуберта прогрессирует развитие сетчатой зоны коры надпочечников, которая начинает секретировать большие количества андрогенов, стимулирующих развитие волосяного покрова лица и тела по мужскому типу. Значительный вклад в становление репродуктивной функции вносит слаженная работа щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы [7]. Клиническими критериями периода полового созревания являются последовательно прогрессирующее развитие вторичных половых признаков у мальчиков: увеличение объема тестикул, рост и пигментация полового члена и мошонки; появление растительности на лобке, в подмышечных впадинах и на лице; изменение голоса и рост щитовидного хряща.

Половое развитие представляет собой неотъемлемую часть пубертата, являясь результатом гармоничной работы нейроэндокринной системы. Известно, что ведущая роль в инициации пубертата принадлежит регулирующей функции гипоталамо-гипофизарно-гонадной и в меньшей степени – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси

В нашем исследовании, в соответствии с рекомендациями М.В. Максимовой [10], мы оценили уровень адренархе у мальчиков по степени оволосения лобка (Р – пубархе), степени оволосения подмышечных впадин (Ах – аксилархе) и степени оволосения лица (F); данные представлены в *таблице 3*. В возрасте 12 лет старт адренархе зарегистрирован у 51% мальчиков, у которых отмечался уровень пубархе 1-й и 2-й степени. С возрастом нарастает как число мальчиков с пубархе, так и степень оволосения лобка. Наши данные свидетельствуют о более раннем старте адренархе у школьников Санкт-Петербурга, чем у мальчиков, обследованных в других регионах [8, 9, 15, 17]. В возрасте 14 лет у трех

подростков не выявлено оволосения лобка, что свидетельствует о задержке старта пубертата и диктует необходимость углубленного обследования.

По данным литературы, примерно 60% патологических состояний, снижающих репродуктивный потенциал мужчины, берет свои корни в различных периодах детства, отрочества, юности

Оволосение подмышечных впадин начинается позже; в возрасте 12 лет у 33% обследованных школьников отмечалось аксилархе 1-й и 2-й степени. Число подростков с аксилархе среди обследованных нами школьников также больше, чем в приведенных в литературе результатах ряда исследований [3, 6, 15], но сопоставимо с показателями у подростков в московском регионе [16]. Среди 12- и 13-летних школьников выявлены подростки с начинающимся ростом стержневых волос над верхней губой и на подбородке, хотя в норме данный процесс начинается с 14 лет [10]. У части 14 и 15-летних подростков отмечается рост волос на лице по взрослому типу; подобный процесс отмечают и другие исследователи [6, 15]. Таким образом, нами выявлен сдвиг начала пубертата на более ранний возраст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным литературы, примерно 60% патологических состояний, снижающих репродуктивный потенциал мужчины, берет свои корни в различных периодах детства, отрочества, юности [14, 17]. Проведенные в Санкт-Петербурге целевые осмотры школьников выявили, что за последние 15 лет в 3,4 раза выросла заболеваемость половых органов у мальчиков и юношей [18]. Одновременно отмечается, что у врачей часто отсутствует настороженность в отношении заболеваний половой сферы у мальчиков; часто формализовано проводится оценка уровня полового созревания. Мониторинг роста детей и подростков позволяет определить тенденции физического и полового развития, установить сроки нормального пубертата, выявить группы риска по снижению репродуктивного потенциала. Данные нашего исследования вносят вклад в базу данных мониторинга здоровья детского населения, проживающих в мегаполисах. Основываясь на результатах исследования, мы сделали следующие выводы:

У значительной части мальчиков (25,3–31,6%) показатели длины тела выше, чем средние возрастные значения, представленные в международных нормативах «WHO Growth Reference 2007». Это может быть проявлением регионарных особенностей ростовых процессов, что определяет необходимость создания новых нормативов соматометрических параметров.

У мальчиков-подростков отмечается высокая распространенность дисгармоничных вариантов физического развития, обусловленных преимущественно избыточной массой тела и ожирением (18,8–30,8%), что

может оказывать негативное влияние на процессы полового созревания.

Инициация адrenaрхе у обследованных школьников происходит в более ранние сроки по сравнению с приведенными данными в литературе, что может быть следствием как продолжающегося процесса акселерации в условиях мегаполиса, так и метаболическими нарушениями обмена веществ, обусловленных высокой распространенностью избыточной массы тела и ожирения. Результаты исследования могут быть использованы при проведении медицинских осмотров в качестве ориенти-

ра сроков пубертата у мальчиков мегаполисов на современном этапе.

Полученные нами данные можно рассматривать в качестве пилотного проекта. Для полной характеристики уровня полового развития мальчиков необходимо учитывать не только степень адrenaрхе, но и оценку гонадархе по J. Tanner, и данные ультразвукового обследования мошонки.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в ходе написания данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Чеботникова Т.В., Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Бутрова С.А. Ожирение и половое развитие: эпидемиологическое исследование детей и подростков Московского региона. *Ожирение и метаболизм*, 2006, 3: 14–20. /Dedov II, Melnichenko GA, Chebotnikova TV, Kuchma VR, Skoblin NA, Butrova SA. Obesity and Sexual Development: an epidemiological study of children and adolescents in the Moscow Region. *Ozhirenie i Metabolism*, 2006, 3: 14–20.
- Грицинская В.Л. Характеристика физического развития питания школьников городского и сельского населения Красноярского края. *Вопросы детской диетологии*, 2012, 10(5): 8–11. /Gritskinskaya VL. Characteristics of the physical development of nutrition of schoolchildren of urban and rural population of the Krasnoyarsk Territory. *Voprosy Detskoy Dietologii*, 2012, 10 (5): 8–11.
- Мельник В.А. Изменение сроков и темпов полового созревания у городских школьников, обследованных в 1982–1983 и 2010–2012 гг. *Журнал Гродненского государственного медицинского университета*, 2015, 4(52): 58–62. Melnik VA. Change in the timing and pace of puberty in urban schoolchildren surveyed in 1982–1983 and 2010–2012. *Zhurnal Grodnenskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta*, 2015, 4 (52): 58–62.
- Михайлова С.В. Показатели полового созревания сельских школьников Нижегородской области. *Морфология*, 2015, 148(4): 37–42. /Mikhaylova S.V. Indicators of puberty rural schoolchildren of the Nizhny Novgorod region. *Morphology*, 2015, 148 (4): 37–42.
- Сергеев О.В., Ревич Б.А., Ли М., Виллиамс П., Коррик С., Бернс Д. и др. Результаты лонгитудинального эпидемиологического исследования факторов, влияющих на рост, физическое и половое развитие мальчиков в городе Чапаевск Самарской области. *Здоровье населения и среда обитания*, 2012, 9: 20–23. /Sergeev OV, Revich BA, Lee M, Williams P, Corrick S, Burns D, et al. Results of a longitudinal epidemiological study of factors affecting the growth, physical and sexual development of boys in Chapaevsk, Samara region. *Zdorovye Naseleniya i Sreda Obitaniya*, 2012, 9: 20–23.
- Цатурян Л.В., Кувандыкова Р.Х., Меликбекян Е.О., Шевякова А.А. Этнические и возрастные особенности полового развития мальчиков-подростков Ставропольского края. *Естественные науки*, 2016, 4(57): 78–84. /Tsaturyan LV, Kuvandykova RKH, Melikbekyan EO, Shevyakova AA. Ethnic and age characteristics of sexual development of teenage boys in the Stavropol Territory. *Estestvennye Nauki*, 2016, 4 (57): 78–84.
- Никитина И.Л. Старт пубертата – известное и новое. *Артериальная гипертензия*, 2013, 19(3): 227–236. /Nikitina IL. Puberty start: known and new. *Arterialnaya Gipertenziya*, 2013, 19 (3): 227–236.
- Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х. Влияние факторов риска на темпы и течение пубертата у мальчиков (обзор литературы). *Международный эндокринологический журнал*, 2011, 1(33): 92–97. /Urmanova YuM, Mavlonov UH. Influence of risk factors on the pace and course of puberty in boys (literature review). *Mezhdunarodny Endokrinologichesky Zhurnal*, 2011, 1 (33): 92–97.
- De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bulletin of the World Health Organization*, 2007, 85: 660–667.
- Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. СПб., 2009, 1008 с. /Mazurin AV, Vorontsov IM. Propaedeutics of childhood diseases. St. Petersburg., 2009, 1008 p.
- Грицинская В.Л., Санчат Н.О., Омзар О.С. Современные тенденции роста, развития и здоровья детей и подростков Республики Тыва. Красноярск, 2009, 100 с. /Gritskinskaya VL, Sanchat NO, Omzar OS. Modern trends of growth, development and health of children and adolescents in the Republic of Tuva. Krasnoyarsk, 2009, 100 p.
- Гусева О.Е., Лощенко М.А., Лебедево О.А., Ануфриева А.В. Некоторые особенности полового развития мальчиков-подростков с ожирением. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*, 2016, 61(4): 262. /Guseva OE, Loschenko MA, Lebedko OA, Anufrieva AV. Some features of sexual development of adolescent boys with obesity. *Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii*, 2016, 61 (4): 262.
- Лабузов Д.С., Лабузова Ю.В. Патология полового развития у мальчиков с ожирением. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*, 2015, 60(4): 240. /Labuzov DS, Labuzova YuV. Pathology of sexual development in boys with obesity. *Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii* 2015, 60 (4): 240.
- Солодилова Е.А., Кондратьева Е.И., Кравец Е.Б., Горбатенко Е.В. Особенности полового созревания у мальчиков с ожирением. *Кубанский научный медицинский вестник*, 2011, 3: 158–164. /Solodilova EA, Kondratieva EI, Kravets EB, Gorbatenko EV. Features of puberty in boys with obesity. *Kubanski Nauchny Medicinski Vestnik*, 2011, 3: 158–164.
- Токарев А.Н., Чагаева Н.В., Петров С.Б., Ложнина И.В., Докучаева С.Ю. Взаимосвязь морфофункциональных показателей и полового развития детей. *Вятский медицинский вестник*, 2014, 2: 28–32. /Tokarev AN, Chagaeva NV, Petrov SB, Lezhnina IV, Dokuchaeva SYu. Interrelation of morphofunctional indicators and sexual development of children. *Vyatskiy Medicinski Vestnik*, 2014, 2: 28–32.
- Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н., Параничева Т.М., Лезжова Г.Н., Тюрина Е.В., Орлов К.В. Особенности физического развития детей 13–14 лет. *Новые исследования*, 2016, 2 (47): 9–23. /Makarova LV, Lukyanets GN, Paranicheva TM, Lezzhova GN, Tyurina EV, Orlov KV. Features of physical development of children of 13–14 years. *Novye Issledovaniya*, 2016, 2 (47): 9–23.
- Муравьева В.Н., Францева В.О., Панченко И.А., Марабян Э.С., Гармаш О.Н., Шипилов А.И. Результаты реализации программы охраны репродуктивного здоровья мальчиков и подростков Ставрополя. *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского*, 2017, 96(2): 187–190. /Muravyeva VN, Frantseva VO, Panchenko IA, Marabyan ES, Garmash ON, Shipilov AI. The results of the implementation of the reproductive health program for boys and adolescents in Stavropol. *Pediatrics. Journal of them. G.N. Speransky*, 2017, 96 (2): 187–190.
- Юрьев В.К., Мирский В.Е. Состояние репродуктивного потенциала школьников Санкт-Петербурга. *Современные проблемы науки и образования*, 2015, 3: 58. /Yuryev VK, Mirsky VE. The reproductive potential of schoolchildren in St. Petersburg. *Sovremennye Problemy Nauki i Obrazovaniya*, 2015, 3: 58.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Грицинская Вера Людвиговна – д.м.н., врач-педиатр высшей категории, профессор кафедры детских болезней Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Мамедова Сабина Михайловна – врач, детский эндокринолог

Никитина Ирина Леоровна – д.м.н., врач-педиатр, детский эндокринолог высшей категории, заведующая НИЛ детской эндокринологии, зав. кафедрой детских болезней Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России